

ANERO

Πολυδύναμο εμβόλιο για την πρόληψη των κλωστριδιακών λοιμώξεων των προβάτων.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το εμβόλιο ANERO περιέχει:

- Ανατοξίνη α του *Clostridium perfringens* τύπος A..... 2 IU/ml
- Ανατοξίνη β του *Clostridium perfringens* τύπος C.....10 IU/ml
- Ανατοξίνη ε του *Clostridium perfringens* τύπος D..... 5 IU/ml
- Διάλυμα φορμαλδεύδης (HCHO).....έως..... 0,05%
- Υδροξείδιο του αργιλίου ($Al(OH)_3$).....0,6-0,8%

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για την πρόληψη των κλωστριδιακών λοιμώξεων:

- Εντεροτοξιναιμία προβάτων.
- Νόσος πολτώδους νεφρού.
- Δυσεντερία αμνών.
- Αιμορραγική εντερίτιδα αμνών.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν εμβολιάζονται ασθενή και παρασιτούμενα ζώα. Εμβολιάζονται ζώα με καλή υγεία και θρέψη.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το εμβόλιο ANERO είναι καλά ανεκτό απο τα ζώα που εμβολιάζονται.

Μια ελαφρά, παροδική αντίδραση στο σημείο της ένεσης (υποδόριο οίδημα) μπορεί να παρατηρηθεί και είναι φυσιολογική.

ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Χορηγείται 1 ml του εμβολίου υποδόρια. Επανάληψη μετά 6 εβδομάδες και κάθε χρόνο. Στα αρνιά συνιστάται ο πρώτος εμβολιασμός να γίνεται στην ηλικία των 3 εβδομάδων. Στις προβατίνες που κυοφορούν συνιστάται ο πρώτος εμβολιασμός να μη γίνεται αργότερα απο το 2,5 μήνα της κύησης και η επανάληψη μετά 6 εβδομάδες, αλλά όχι αργότερα απο τον 4 μήνα της κύησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν υπάρχει.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ - ΦΥΛΑΞΗ

Το ANERO παραμένει σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται σε σκοτεινό χώρο θερμοκρασίας 4° - 8° C.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΦΟΥ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24 ΩΡΩΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ