

GABBROSTIM[®]
Ενέσιμο διάλυμα αλφαπροστόλης 0,2%

ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε ml του προϊόντος περιέχει 2 mg αλφαπροστόλης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αγελάδες - Δαμάλια: Πρόκληση και συγχρονισμός οίστρου, πρόκληση τοκετού, σιωπηλός οίστρος, πυομήτρα, αποβολή μουμιοποιημένου εμβρύου.

Σύες: Πρόκληση τοκετού από την 111η ημέρα της κύησης.

Φορβάδες: Πρόκληση οίστρου σε ζώα με κανονικό κύκλο, πρόκληση οίστρου μετά από τοκετό, άνοιστρος περίοδος.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Σε μερικές σύες είναι δυνατό να προκληθεί παροδική ταχύπνοια.

Δεν πρέπει να χορηγείται σε έγκυα ζώα, εκτός αν επιδιώκεται αποβολή για θεραπευτικούς σκοπούς.

Να μη συνδυάζεται με αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

Να αποφεύγεται η δερματική επαφή με το προϊόν και σε περίπτωση επαφής να πλένεστε με άφθονο νερό. Το προϊόν δεν πρέπει να χειρίζονται έγκυες γυναίκες ή ασθματικά άτομα.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορηγείται με βαθειά ενδομυϊκή ένεση.

Αγελάδες - Δαμάλια: 0,75 ml / 100 kg Σ.Β. και μέχρι 4 ml.

Σύες: 1 ml ανά ζώο οποιουδήποτε βάρους.

Φορβάδες: 1,5 ml ανά ζώο οποιουδήποτε βάρους.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

24 ώρες για το κρέας και το γάλα.

ΦΥΛΑΞΗ

Σε θερμοκρασία μέχρι 25° C και προστασία από το φως.

Ειδικές προφυλάξεις για την καταστροφή του αχρησιμοποίητου υλικού και των άχρηστων φιαλιδίων δεν απαιτούνται.

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ