

GLEPTOSIL® Ενέσιμο

ΓΕΝΙΚΑ

Στείρο υδατικό κολλοειδές διάλυμα Gleptoferron, μακρομοριακό σύμπλεγμα, περιέχει σίδηρο (200 mg/ml) σε ετοιμόχρηστο μορφή.

ΣΥΝΘΕΣΗ ανά ml

Iron (as Gleptoferron)	200 mg
Phenol	5 mg
Εκδοχα.....έως.....	1 ml

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για την πρόληψη και θεραπεία της σιδηροπενικής αναιμίας των χοιριδίων. Χοιρίδια που γεννιώνται και αναπτύσσονται κάτω από εντατικές συνθήκες εκμετάλλευσης πάσχουν από έλλειψη σιδήρου και σύντομα γίνονται αναιμικά εκτός και αν τους χορηγηθεί συμπληρωματικός σίδηρος στα αρχικά στάδια της ζωής τους. Η αναιμία προκαλεί μείωση της ζωτικότητας, χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης και αύξηση της ευαισθησίας των χοιριδίων.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Για την πρόληψη της σιδηροπενικής αναιμίας χορηγείται 1 ml (200 mg σίδηρος) στη διάρκεια των τριών πρώτων ημερών της ζωής. Η κλινική αναιμία συνήθως εμφανίζεται τις δυο πρώτες εβδομάδες της ζωής. Σε περίπτωση διάγνωσης σιδηροπενικής αναιμίας η θεραπεία είναι 1 ml (200 mg σίδηρος).

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν υπάρχει.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Το Gleptosil συνιστάται να χορηγείται βαθιά ενδομυϊκά στο μηρό. Το σημείο της έγχυσης πρέπει να απολυμαίνεται με οινόπνευμα πριν την έγχυση. Η σύριγγα και οι βελόνες πρέπει να αποστειρώνονται με βρασμό (όταν χρησιμοποιείται η ειδική σύριγγα δείτε τις αντίστοιχες οδηγίες).

Ειδική δοσομετρική σύριγγα

Το φιαλίδιο του Gleptosil (πολυαιθυλένιο) έχει σχεδιαστεί ειδικά για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ειδική σύριγγα.

Η δοσομετρική σύριγγα με το φιαλίδιο δημιουργούν ένα κλειστό στείρο σύστημα που παρέχει ακρίβεια στη δόση και ευχέρεια στη χρήση.

ΦΥΛΑΞΗ

Το Gleptosil πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (μέχρι 25°C).

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Δυο χρόνια και αφού ανοιχθεί 3 μήνες.