

Ilcocillin PS

Ονομασία του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ILCOCILLIN® PS

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικά συστατικά

Κάθε ml του ενέσιμου εναιωρήματος περιέχει 200.000 IU procainebenzylpenicilline και 250 mg dihydrostreptomycine (sulfate), και έκδοχα.

Φαρμακοτεχνική μορφή

Ενέσιμο εναιώρημα

Φαρμακολογικές ιδιότητες

Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Η προκαϊνική πενικιλίνη ανήκει στις περιορισμένου φάσματος ευαίσθητες στις β-λακταμάσες. Το φάσμα της περιλαμβάνει αερόβιους Gram (+) μικροοργανισμούς και εκτός ολίγων εξαιρέσεων (*Haemophilus*, *Neisseriaspp.* και στελέχη *Bacteroides*) είναι αδρανής στους Gram (-) μικροοργανισμούς.

Το φάσμα δράτης της προκαϊνικής πενικιλίνης περιλαμβάνει *Gram (+) cocci*, *Streptococci*, *Staphylococci* ευαίσθητους στις πενικιλινάσες, *Corynebacterium pyogenes*, *Clostridiaspp*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Actinomyces visus*, *Leptospira canicola*, *Bacillus anthracis*, *Fusiformis nodosus* και *Nocardiaspp*.

Η διυδροστρεπτομυκίνη είναι δραστική έναντι ενός μεγάλου αριθμού Gram (-) μικροοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των *Escherichiacoli*, *Klebsiellaspp*, *Proteus spp*, *Enterobacterspp*, *Brucellaspp*, *Salmonella spp*.

Ο συνδυασμός στρεπτομυκίνης και πενικιλίνης εξασφαλίζει ένα ευρύ φάσμα αντιβακτηριακής δράσης.

Η δράση του φαρμάκου οφείλεται στην αναστολή της βιοσύνθεσης του βακτηριακού τοιχώματος στο αναπτυσσόμενο βακτηρίσιο (στάδιο πολλαπλασιασμού). Η βακτηριοκτόνος δράση είναι άμεση. Αρχίζει 30-60 λεπτά από την ένεση.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.

1. Είδη ζώων για τα οποία προορίζεται

Ίπποι

Βοοειδή – μόσχοι

Αίγες – πρόβατα – αμνοί - ερίφια

Χοίροι

Σκύλοι

Γάτες

2. **Ενδείξεις**

Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση οξείων και χρονίων λοιμώξεων του αναπνευστικού, γαστρεντερικού και ουροποιητικού συστήματος, οι οποίες προκαλούνται από μικροοργανισμούς ευαίσθητους στο συνδυασμό στρεπτομυκίνης-πενικιλίνης όπως: πνευμονία βρογχοπνευμονία, ακτινομύκωση, σηψαιμία, ερυθρά, λεπτοσπείρωση, λιστερίωση, καθώς και για την αντιμετώπιση δευτερογενών λοιμώξεων οι οποίες ακολουθούν

λοιμώξεις οφειλόμενες σε ιούς. Επίσης ενδείκνυται για τη συμπτωματική θεραπεία σε σύνθετες λοιμώξεις όπου δεν είναι δυνατή διαφορική διάγνωση.

3. Αντενδείξεις

Να μη χορηγείται σε ζώα ευαίσθητα στις πενικιλίνες ή τη στρεπτομυκίνη. Αντενδείκνυται η ενδοφλέβια χορήγηση γιατί μπορεί να προκαλέσει ισχυρό αναφυλακτικό shock ή θρομβοφλεβίτιδα. Επίσης είναι δυνατόν να παρατηρηθούν φαινόμενα ωτοτοξικότητας και νεφροτοξικότητας.

Το ILCOCILLIN® PS αντενδείκνυται για χρήση στα πτηνά.

1.

1. Ανεπιθύμητες ενέργειες

Είναι δυνατόν να παρουσιαστούν αλλεργικές αντιδράσεις οι οποίες ελέγχονται με τη χρήση αντιισταμινικών και επινεφρίνης.

2. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χορήγηση

Δεν υπάρχουν.

3. Χορήγηση κατά την εγκυμοσύνη και τη γαλουχία

4. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Επειδή υπάρχει ανταγωνιστική δράση πρέπει να αποφεύγεται ο συνδυασμός ταυτόχρονης χορήγησης με σουλφοναμίδες, χλωραμφαινικόλη και τετρακυκλίνες.

5. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Δοσολογία

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Ίπποι . βοοειδή | 1 ml ανά 20-30 kg βάρους σώματος |
| Αίγες πρόβατα –μόσχοι - χοίροι | 1 ml ανά 20-30 kg “ |
| Χοιρίδια - σκύλοι | 1 ml ανά 10-20 kg “ |
| γάτες | 0,1 ml ανά 1-2 kg “ |

9. Τρόπος και οδός χορήγησης

Το ενέσιμο εναιώρημα ILCOCILLIN® PS πρέπει να χορηγείται με ενδομυϊκή ή υποδόρια ένεση, λαμβάνοντας φυσιολογικά μέτρα ασηψίας.

10. Ανακινείστε καλά το φιαλίδιο πριν από τη χρήση.

11. Η χορήγηση γίνεται κάθε 24 ώρες και η διάρκεια θεραπείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 ημέρες.

1.

1. Υπερδοσολογία

Πρέπει να αποφεύγεται η υπερδοσολογία.

2. **Χρόνος αναμονής**
Κρέας : 28 ημέρες μετά την τελευταία χορήγηση.
Γάλα : 3 ημέρες μετά από την τελευταία ένεση του φαρμάκου.
3. **Ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για το άτομο που χορηγεί το προϊόν στα ζώα.**
Άτομα ευαίσθητα στην πενικιλλίνη ή τη στρεπτομυκίνη να αποφεύγουν την επαφή με το προϊόν.

Φαρμακευτικές πληροφορίες

1.
 1. **Ασυμβατότητες**
Η προκαϊνική πενικιλλίνη είναι ασύμβατη με διαλύματα γλυκόζης – δεξτρόζης.
 2. **Διάρκεια ζωής (όπου απαιτείται – μετά το άνοιγμα του περιέκτη ή μετά την ανασύσταση)**
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι 2 χρόνια.
 3. **Ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του προϊόντος**
Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε σκοτεινό και δροσερό μέρος, σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 ο C .
Να αποφεύγεται η έκθεση σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.
 4. **Φύση και περιεχόμενο του περιέκτη**
Το προϊόν συσκευάζεται σε φιαλίδια των 100 ml .
 5. **Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας του Προϊόντος**
Προϊόν PremierShukuroglouHellas A. E .

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας για την Ελλάδα
PremierShukuroglouHellas A. E .
Λεωφ . Μεσογείων 198
155 61 Χολαργός

20. Ιδιαίτερες προφυλάξεις για την απόρριψη του αχρησιμοποίητου προϊόντος ή των υλικών συσκευασίας
Δεν υπάρχουν.

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας :

Ημερομηνία έγκρισης της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος :

Τρόπος χορήγησης του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος στους ιδιοκτήτες των

ζώων :

Να χορηγείται μόνο με κτηνιατρική συνταγή.