FUCITHALMIC® VET

10mg/g οφθαλμικές σταγόνες, εναιώρημα για σκύλους

Fusidic acid

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και του κατόχου της άδειας παραγωγής που είναι υπεύθυνος για την αποδέσμευση παρτίδων στον ΕΟΧ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
DK-7171 Uldum
Δανία

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
Leo Pharmaceutical Products
Industriparken 55, DK-2750 Ballerup
Denmark

Σύνθεση
Σε κάθε 1 g εναιωρήματος περιέχονται:Δραστικό συστατικό: Fusidic acid hemihydrate (Ph.Eur) (αντιστοιχεί σε Fusidic acid) 10,0 mg

Ανοσοενισχυτικές ουσίες:
Benzalkonium chloride (0,1mg)
Disodium edentate (0,5mg)

Ενδείξεις
Για την τοπική θεραπεία της επιπεφυκίτιδας των σκύλων, η οποία προκαλείται από Staphylococcus aureus και ιδιαίτερα Staphylococcus intermedius.

Αντενδείξεις
Το FUCITHALMIC® Vet δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις επιπεφυκίτιδας, όπως αυτές που προκαλούνται από ψευδομονάδες. Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό, στις ανοσοενισχυτικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Δεν είναι γνωστή καμία.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

Είδη ζώων

Σκύλος.



Δοσολογία για κάθε είδος, τρόπος και οδός χορήγησης
Ενσταλάζεται μία σταγόνα FUCITHALMIC® Vet στο σάκο του επιπεφυκότα μία έως δύο φορές ημερησίως. Η θεραπεία συνεχίζεται για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την αποθεραπεία. Εάν δεν παρατηρηθούν εμφανείς ενδείξεις ίασης μέσα σε 5 ημέρες από την έναρξη της θεραπείας θα πρέπει να αναθεωρείται η διάγνωση.
Σε περίπτωση που η λοίμωξη περιορίζεται στο ένα μάτι συνιστάται η θεραπεία και των δύο οφθαλμών προς αποφυγή της μόλυνσης και του δεύτερου. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται όπως η θεραπεία αρχίζει από το μη μολυσμένο μάτι.

Οδηγίες για τη σωστή χορήγηση
Σε περίπτωση που η λοίμωξη περιορίζεται στο ένα μάτι συνιστάται η θεραπεία και των δύο οφθαλμών προς αποφυγή της μόλυνσης και του δεύτερου.
Στην περίπτωση αυτή συνιστάται όπως η θεραπεία αρχίζει από το μη μολυσμένο μάτι.

Χρόνος αναμονής
Δεν ισχύει

Dechra

Ειδικές συνθήκες διατήρησης
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C.
Επανατοποθετήστε το καπάκι ανάμεσα στις χρήσεις.
Να μη χρησιμοποιείται μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί και στο σωληνάριο (EXP:).

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη:
28 ημέρες

Ειδικές προειδοποιήσεις
Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα
Αποκλειστικά για εξωτερική χρήση.
Θα πρέπει κατά τη χορήγηση του φαρμάκου να μην έρχεται σε επαφή το ρύγχος του σωληναρίου με το μάτι, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση του περιεχομένου. Να αποφεύγεται η επαφή των δακτύλων με το ρύγχος του σωληναρίου.

Να μη χρησιμοποιείται το ίδιο σωληνάριο για τη θεραπεία διαφορετικών ζώων.
Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα
Πλύνετε τα χέρια μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Χρήση κατά την κύηση και τη γαλουχία
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.
Συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων.
Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ημερομηνία της τελευταίας έγκρισης του φύλλου οδηγιών χρήσεως
07/08/2007

Άλλες πληροφορίες
Σωληνάρια αλουμινίου των 3 g και 5 g.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

Αντιπρόσωπος Ελλάδας
ALTAVET E.E.
Φωτίου Κορυτσάς 16, 17237
Υμηττός
Τηλ. 210 9752347

Dechra