

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Δικαιούχος: Schering-Plough Animal Health Corp., USA
Παρασκευαστής: Schering-Plough Sante Animale, Segre, France.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Intervet Hellas AE, Αγίου Δημητρίου 63, 17455, Αλιμος.

Lacrimmune

Οφθαλμική αλοιφή.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Δραστικό συστατικό:
1 g περιέχει 2 mg κυκλοσπορίνης A.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για τη θεραπεία της χρόνιας ιδιοπαθούς ξηράς κερατοεπιπεφυκίτιδας του σκύλου.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Κατά τις πρώτες ημέρες της θεραπείας ενδέχεται να παρατηρηθεί ήπιος ερεθισμός (τσούξιμο) ο οποίος, εάν παρατείνεται πέραν των 7 ημερών, δημιουργεί υποψία υπερευαισθησίας στο φάρμακο, γεγονός που προϋποθέτει την επανεκτίμηση της θεραπευτικής αγωγής.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑ

Να μη χορηγείται σε κυοφορούντα και γαλουχούντα ζώα.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Απομακρύνεται το παθολογικό υλικό με ένα κατάλληλο μη ερεθιστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, τοποθετείται στον προσβλημένο οφθαλμό ποσότητα αλοιφής μήκους 1 cm, κάθε 12 ώρες. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τη σοβαρότητα της κατάστασης και από την ανταπόκριση στην αγωγή. Η κλινική εμπειρία υποδεικνύει ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των σκύλων απαιτεί μακροχρόνια θεραπεία. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της ξηράς κερατοεπιπεφυκίτιδας συνιστάται η έγκαιρη χορήγηση του Lacrimmune στα αρχικά στάδια της παθώσεως και πριν την εγκατάσταση μόνιμων, μη αναστρέψιμων βλαβών και ινώσεως του δακρυϊκού ιστού. Βελτίωση του αποτελέσματος της δοκιμασίας Schirmer Tear Test αποτελεί ένδειξη καλής προγνώσεως εφόσον συνεχίζεται η θεραπεία.

ΦΥΛΑΞΗ

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 1 μήνας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληνάριο 3,5 g.
Όπως όλα τα φάρμακα φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΑΜΚ: 19498/07-06-1999