



**Marbocyl P20mg** δισκία για σκύλους

**ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ**

Vetoquinol S.A.  
Magny-Vernois, BP 189  
70200 Lure Cedex  
France (Γαλλία)

**ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

MARBOCYL P 20 mg δισκία για σκύλους  
Marbofloxacin

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**

Marbofloxacin .....20 mg

Υπόλευκα με φαιές κηλίδες κυκλικά δισκία, διαιρέσιμα στη μέση.

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

- Θεραπεία λοιμώξεων του δέρματος και των μαλακών ιστών, σε σκύλους, που οφείλονται σε μικροβιακά στελέχη ευαίσθητα στη μαρβοφλοξακίνη.
- Θεραπεία λοιμώξεων των ουροφόρων οδών, σε σκύλους, που οφείλονται σε μικροβιακά στελέχη ευαίσθητα στη μαρβοφλοξακίνη.

**ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

- Να μη χορηγείται σε αναπτυσσόμενους σκύλους ηλικίας μικρότερης των 8-18 μηνών, αναλόγως του μεγέθους της φυλής.
- Να μη χορηγείται σε συνδυασμό με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) σε σκύλους με ιστορικά επιληπτικών κρίσεων.

**ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Ήπιες μορφές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως έμετος, αλλεργική αντίδραση, πόνος στις αρθρώσεις, μαλακής σύστασης κόπρανα, δίψα, παροδική αύξηση της κινητικής δραστηριότητας, δυνατό να παρατηρηθούν σποραδικά. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρέχονται μετά το πέρας της θεραπείας.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών χρήσεως, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον κτηνίατρό σας.

**ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ**

Σκύλοι



**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

Η συνιστώμενη δόση σε σκύλους είναι 2 mg/kg σ. β. μια φορά την ημέρα. Τα δισκία να χορηγούνται από το στόμα, απευθείας ή αναμειγμένα στην τροφή.

**Η δόση δυνατό να υπολογιστεί ως εξής:**

Μεσαίου μεγέθους σκύλοι: 1 δισκίο 20 mg ανά 10 kg σ.β.

**Διάρκεια της θεραπείας:**

- Σκύλοι:
- Σε λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών η διάρκεια της θεραπείας είναι τουλάχιστο 5 ημέρες. Αναλόγως της πορείας της λοίμωξης, η θεραπεία δυνατό να παραταθεί μέχρι και 40 ημέρες.
- Σε λοιμώξεις των ουροφόρων οδών η διάρκεια της θεραπείας είναι τουλάχιστο 10 ημέρες. Αναλόγως της πορείας της λοίμωξης, η θεραπεία δυνατό να παραταθεί μέχρι και 28 ημέρες.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Καμία.

**ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Δεν εφαρμόζεται.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη. Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται στη συσκευασία.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

Δεν υπάρχουν στοιχεία για πιθανή βλάβη του αμφιβληστροειδή.

**Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα**

Να μη χορηγείται σε σκύλους με γνωστή υπερευαισθησία στις κινολόνες. Να μη χορηγείται σε αρσενικούς σκύλους οι οποίοι χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή, διότι δεν υπάρχουν στοιχεία για την επίδρασή του στη γονιμότητα των αρσενικών σκύλων.

**Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα**

Μη χειρίζεστε το προϊόν εάν υπάρχει γνωστή υπερευαισθησία στις φθοροκινολόνες. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, ιδίως από παιδί, να αναζητηθεί ιατρική συμβουλή.

**Άλλες προφυλάξεις**

Χορήγηση μιας μόνο ομάδας αντιβιοτικών είναι δυνατό να οδηγήσει στη δημιουργία ανθεκτικών στελεχών βακτηρίων. Οι φθοροκινολόνες είναι συνετό να φυλάσσονται ως εφεδρεία για τη θεραπεία κλινικών καταστάσεων που έχουν ή αναμένεται να έχουν ανεπαρκή ανταπόκριση σε άλλες ομάδες αντιβιοτικών. Το Marbocyl P θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατόπιν δοκιμής ευαισθησίας.

**Χρήση κατά την κήση και τη γαλουχία**

Να μη χορηγείται σε ζώα που κνοφορούν ή γαλουχούν.

**Άλληλεπίδρασεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης**

Σε περίπτωση ταυτόχρονης χορήγησης από το στόμα με κατιόντα (αργίλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρος), δυνατό να μειωθεί η βιοδιαθεσιμότητα της μαρβοφλοξακίνης. Συνιστάται η μείωση της δόσης της θεοφυλλίνης όταν χορηγείται ταυτόχρονα. Οι φθοροκινολόνες να μη χορηγούνται σε συνδυασμό με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) σε σκύλους με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων.

**Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, antidota, εάν είναι απαραίτητα)**

Μόνο πολύ υψηλές δόσεις (>2.000 mg/kg) μπορούν να προκαλέσουν οξεία νευρολογικά συμπτώματα, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπτωματικά.

**Ασυμβατότητες**

Καμία γνωστή.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΆΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματα του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

Φεβρουάριος 2011.

**ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**Συσκευασία**

Κουτιά των 10, 20, 30, 40, 50, 100, 250 δισκίων.  
Δυνατό να μη βρίσκονται στην αγορά όλες οι συσκευασίες.

**ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**

81977/23-11-2011

**ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΟΣ**

CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ  
Αγ. Νικολάου 15  
174 55 Άλμος  
τηλ. 210 9851200

