

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

CLAMOXYL LA

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Δικαιούχος σήματος: Pfizer Inc, NY, USA

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: Haupt Pharma Latina Srl, Italy

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σε Ελλάδα και Κύπρο: Pfizer Hellas ΑΕ, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800, ΑΜΚ: 16951/4-3-09

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

CLAMOXYL LA

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ (Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ (Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Ανά ml:

Amoxicillin Trihydrate 176mg

Αντιστοιχεί σε Amoxycillin 150mg

Έκδοχα:

Aluminum Stearate 16 mg

Fractionated coconut oil έως 1ml

Phenol BP

Coconut oil Base

4. ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ)

Για τον έλεγχο πρωτογενών και δευτερογενών λομώξεων , που προκαλούνται

Από ευαίσθητους στην αμοξικιλίνη μικροοργανισμούς στα βοοειδή, πρόβατα

χοίρους, σκύλους και γάτες, όπου είναι επιθυμητή η παρατεταμένη δραστηριότητα με μία μόνο ένεση.

Το GlamoxyL LA συνιστάται κυρίως για:

-Λοιμώξεις του πεπτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της εντερίτιδας.

-Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος,

-Λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών, συμπεριλαμβανομένων των τραυμάτων, αποστημάτων, αρθρίτιδων και ομφαλίτιδας.

-Πρόληψη των μετεγχειρητικών λοιμώξεων.

-Σαν συμπλήρωμα στην ενδομαστική θεραπεία της μαστίτιδας των βοοειδών.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η αμοξικιλίνη, όπως και οι άλλες πενικιλίνες, δεν πρέπει να χορηγείται από το στόμα ή παρεντερικά στα κουνέλια και στα τρωκτικά όπως ινδικά χοιρίδια, κρικητοί γερβίλοι κ.ά. Επίσης δεν πρέπει να χορηγείται σε ζώα με ιστορικό υπερευαισθησίας.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μερικές φορές μπορεί να παρατηρηθεί τοπική αντίδραση των ιστών στην περιοχή της ένεσης. Επίσης μπορεί να παρατηρηθούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι, σκύλοι, γάτες.

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ (ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 15 mg / kg σωμ. Βάρους. Εάν κριθεί απαραίτητο η ίδια δοσολογία μπορεί να επαναληφθεί μετά 48 ώρες. Η συνιστώμενη δοσολογία αντιστοιχεί σε 1 ml /10 kg σωμ. Βάρους.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Να ανακινείτε καλά το φιαλίδιο πριν τη χρήση για να επιτευχθεί καλύτερη κατανομή της δραστικής ουσίας. Να χορηγείται μόνο υποδόρια ή ενδομυϊκά η απαιτούμενη ποσότητα. Μετά μαλάξτε την περιοχή της ένεσης (για την ευκολότερη χορήγηση στους σκύλους και γάτες να μη χρησιμοποιείτε βελόνες λεπτότερες από το Νο 20). Εάν η ποσότητα που πρέπει να χορηγηθεί είναι μεγαλύτερη από 20 ml να μοιράζεται και να ενίεται σε δύο διαφορετικά σημεία του σώματος.

Όπως συμβαίνει και με τα άλλα σκευάσματα πενικιλίνης, με την παρουσία νερού γίνεται ταχύτατα υδρόλυση. Επομένως είναι σημαντικό η σύριγγα με την οποία θα αναρροφηθεί η απαιτούμενη ποσότητα από το φιαλίδιο, να είναι στεγνή ώστε να μην έρθει σε επαφή η παραμένουσα στο φιαλίδιο ποσότητα με σταγόνες νερού.

Για να αποφευχθεί ο υπερβολικός αριθμός διατρήσεων του ελαστικού πώματος, συνιστάται όπως το φιαλίδιο των 250 ml χρησιμοποιείται μόνο για τη θεραπεία των μεγάλων ζώων.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Βοοειδή: Κρέας: 92 ημέρες

Γάλα: 9 ημέρες
Πρόβατα: Κρέας: 45 ημέρες
Γάλα : 156 ώρες
Χοίροι: Κρέας 93 ημέρες

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διατηρείται το φάρμακο σε θερμοκρασία μικρότερη από 25° C. Ο χρόνος ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα είναι 1 μήνας.

12. ΕΙΔΙΚΗ (ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣ)

Να φυλάγεται μακριά από τα παιδιά.

13.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Να χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.

Να φυλάγεται μακριά από τα παιδιά.

Τηλ. Κέντρου Δηλ.: 210 7793777

ΑΜΚ: 16951/ 4-3-09