

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

CEVAC UNI L NEWCASTLE DISEASE VACCINE ΕΜΒΟΛΙΟ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ HITCHNER B1

Το CEVAC Uni L είναι εμβόλιο από ζωντανό ιό, αποξηραμένο και σφραγισμένο σε κενό. Διατηρείται στο ψυγείο σε θερμοκρασία 2-5° C.

Σύνθεση (ανά δόση εμβολίου)

Newcastle disease virus, Strain Hitchner B1.....min 10^{5,5} EID₅₀

Χορήγηση του εμβολίου

- με πόσιμο νερό

1. Μη χορηγείτε νερό στα πτηνά 4 ώρες πριν τον εμβολιασμό. Καθαρίστε καλά τις ποτίστρες με νερό χωρίς να χρησιμοποιήσετε απολυμαντικά.

2. Αναμίξτε το περιεχόμενο του φιαλιδίου των 1000 δόσεων με καθαρό δροσερό πόσιμο νερό ως εξής:

α) Για 1000 πτηνά ηλικίας 3 ημερών – 4 εβδομάδων σε 10 kg νερό.

β) Για 1000 πτηνά ηλικίας 4 εβδομάδων – 8 εβδομάδων σε 20 kg νερό.

γ) Για 1000 πτηνά ηλικίας 8 εβδομάδων και άνω σε 40 kg νερό.

3. Αφού αναμείξετε το εμβόλιο με το νερό τοποθετήστε το στις ποτίστρες των πτηνών. Συνιστάται να αυξήσετε τον αριθμό των ποτιστρών και τα πτηνά να μετακινούνται, ώστε να μπορούν όλα να πιουν.

4. Μη χορηγείτε στα πτηνά άλλο νερό πριν καταναλωθεί αυτό που περιέχει το εμβόλιο. Αμέσως μετά μπορείτε να συνεχίσετε τη χορήγηση του νερού όπως συνήθως.

- με ενστάλαξη στον οφθαλμό

Για τη χορήγηση του εμβολίου με ενστάλαξη στον οφθαλμό χρησιμοποιείται ως διαλύτης φυσιολογικός ορός 30 ml για 1000 δόσεις εμβολίου. Μια δόση εμβολίου μετά την ανασύστασή του είναι μια σταγόνα.

Ηλικία εμβολιασμού

Το εμβόλιο Cenvac Uni L χορηγείται με το πόσιμο νερό σε πτηνά ηλικίας 3^{ωv} ημερών και άνω και με ενστάλαξη στον οφθαλμό σε πτηνά ηλικίας 1ας ημέρας.

Συνιστάται επανεμβολιασμός των πτηνών σε ηλικία 4 εβδομάδων. Τα πτηνά αναπαραγωγής να επανεμβολιάζονται σε ηλικία 16-20 εβδομάδων και στη συνέχεια κάθε 6 μήνες.

Προφυλάξεις

1. Χρησιμοποιείστε όλο το εμβόλιο αμέσως μετά την ανάμιξη.

2. Μετά τον εμβολιασμό κάψτε τα άδεια φιαλίδια με τα τυχόν υπολείμματα του εμβολίου.

3. Εμβολιάζονται μόνο υγιή πτηνά.

4. Ο ιός της ψευδοπανώλης μπορεί να προκαλέσει ήπια φλεγμονή στους οφθαλμούς του ανθρώπου, που διαρκεί 2-3 ημέρες. Γι' αυτό να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή του εμβολίου με τους οφθαλμούς του ατόμου που χειρίζεται το εμβόλιο.

Χρόνος αναμονής

Να μην εμβολιάζονται τα πτηνά 21 ημέρες πριν τη σφαγή.

Συσκευασία

Φιαλίδια 1000 δόσεων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

CEVA SANTE ANIMALE - ΓΑΛΛΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

CEVA PHYLAXIA – ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

CEVA ΕΛΛΑΣ