

Calgophos®

Διαιτητικό πόσιμο διάλυμα ασβεστίου, φωσφόρου
και ιχνοστοιχείων



Σύνθεση:

Ολικός φώσφορος	235 g	Ασβέστιο	103 g	Μαγκάνιο	10,8 g
Ψευδάργυρος	10,2 g	Μαγνήσιο	108 g	Χαλκός	2,5 g
Νάτριο	45,2 g	Κοβάλτιο	0,1 g	Σίδηρος	13,9 g

Ενδείξεις:

Το Calgophos είναι σταθερό συμπυκνωμένο διάλυμα μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων υψηλής βιοδιαθεσιμότητας. Χορηγείται ως διατροφικό συμπλήρωμα σε περιπτώσεις ισορρόπησης του σιτηρεσίου σε ασβέστιο/φώσφορο και σε περιπτώσεις σοβαρών πρωτογενών ή δευτερογενών ελλείψεων αλάτων και ιχνοστοιχείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα είδη των ζώων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, σε μεταβολικά νοσήματα, προβλήματα με τις οπλές και στα πτηνά κυρίως σε μειωμένη ωοπαράγωγή, προβλήματα του κελύφους των αυγών, προβλήματα οστεοποίησης, κλπ.

Δοσολογία και τρόπος χρήσης:

Χορηγείται από το στόμα διαλυμένο σε πόσιμο νερό. Πτηνά: 1 L ανά 200 L νερού, σύμφωνα με τον πίνακα.

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΗΛΙΚΙΑ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Κοτόπουλα κρεατοπα- ραγωγής & πουλάδες	Περίοδος οστεοποίησης	Μεταξύ 2ης και 4ης εβδομάδας	3 ημέρες ανά εβδομάδα	Πρόληψη προβλημάτων οστε- οποίησης και ανάπτυξης σκε- λετού
Κότες ωοπαραγωγής και αναπαραγωγής	Ωοπαραγωγή	Μεταξύ 21ης εβδ. και 26ης εβδ.	3 ημέρες ανά 2 εβδομά- δες & καθημερινά την εβδομάδα της μέγιστης ωοπαραγωγής	Διασφάλιση καλής ποιότητας κελύφους και σταθερής ωοπα- ραγωγής, χωρίς προβλήματα στα οστά
Κότες ωοπαραγωγής και αναπαραγωγής	Τελικό στάδιο ωοπαραγωγής	Μετά την 50η εβδομάδα	Για 1 εβδομάδα καθημε- ρινά και μετά 3 ημέρες ανά 2 εβδομάδες	Διασφάλιση καλής ποιότητας κελύφους και σταθερής ωοπα- ραγωγής, χωρίς προβλήματα στα οστά

Μηρυκαστικά:

Αγελάδες: 75 - 100 ml ανά ζώο καθημερινά επί 3-5 ημέρες.

Μόσχοι: 25 - 50 ml ανά ζώο καθημερινά επί 3-5 ημέρες.

Αιγοπρόβατα: 25 ml ανά ζώο καθημερινά επί 3-5 ημέρες.

Χοίροι:

Νεαρές χοιρομητέρες / κάπροι και απογαλακτισμένα: 1L σε 200 L νερού για 1 εβδομάδα.

Διάρκεια ζωής: 4 χρόνια εφόσον φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου.

Συσκευασία: Φιάλη του 1L και 30L. ■