

Φύλλο οδηγιών χρήσης (Leaflet)

DIARSANYL® PLUS πάστα

Διαιτητικό προϊόν για σκύλους και γάτες.

Μείωση των οξείων διαταραχών της απορροφητικής λειτουργίας του εντέρου.

Στοματική πάστα.

Χρήση:

Η DIARSANYL® PLUS πάστα συνιστάται για χρήση κατά τη διάρκεια περιόδων οξείας διάρροιας και ανάρρωσης από οξεία διάρροια. Πριν τη χρήση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου.

Σύνθεση:

4.1.14 Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες
13.2.2 Δεξτρόζη
13.8.2 Γλυκερίνη
11.4.1 Χλωριούχο νάτριο
11.2.10 Οργανικά άλατα μαγνησίου

Πρόσθετα:

Τεχνολογικά πρόσθετα: συγκολλητικά μέσα, αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες και πηκτικοί παράγοντες: βεντονίτης – μοντμοριλλονίτης (E558) 40%, Συντηρητικά: σορβικό κάλιο (E202) 2%.

Συστατικά:

Αναλυτική σύσταση: ολική πρωτεΐνη: 2,5 %, ολικές ίνες: 2,5%, ολικά έλαια και λίπη: 0%, ολική τέφρα: 30%, συνολικοί υδατάνθρακες: 46%, νάτριο: 2.5%, κάλιο: 0,6%.
Υγρασία: 22%.

Ιδιότητες:

Η DIARSANYL® PLUS πάστα με το ευχάριστο άρωμα και γεύση λαμβάνεται από τους περισσότερους σκύλους οικειοθελώς. Ασχέτως αιτιολογικού παράγοντα, η φυσική στοιβάδα βλεννίνης που επενδύει τον εντερικό βλεννογόνο αλλοιώνεται. Για την πρόληψη περαιτέρω αλλοιώσεων, ο περιεχόμενος στην Diarsanyl Plus πάστα, βεντονίτης-μοντμοριλλονίτης σχηματίζει μια προστατευτική στοιβάδα στην επιφάνεια του ερεθισμένου βλεννογόνου και επίσης βοηθά στην αναγέννηση της φυσικής στοιβάδας βλεννίνης. Ο βεντονίτης-μοντμοριλλονίτης απορροφά επιβλαβείς παράγοντες (τοξίνες, βακτήρια, ιοί, κλπ.), που έτσι δεν απορροφώνται από το έντερο ώστε να προκαλέσουν βλάβες στον οργανισμό. Οι περιεχόμενοι στο προϊόν ηλεκτρολύτες συμβάλλουν στην αποκατάσταση των ουσιαστών ιόντων που χάνονται με τη διάρροια. Η δεξτρόζη αποτελεί μια εύκολα προσβάσιμη πηγή ενέργειας, χωρίς να υπερπληρώνεται ο οργανισμός. Οι φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS), λεγόμενοι και πρεβιοτικά, διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων της φυσιολογικής εντερικής μικροχλωρίδας.

Οδηγίες χρήσης:

Χορήγηση από το στόμα. Υπάρχουν 10 πτερυγίδια στο έμβολο της σύριγγας των 10 ml, κάθε πτερυγίδιο αντιστοιχεί σε 1 ml πάστας. Υπάρχουν 12 πτερυγίδια στο έμβολο της σύριγγας των 24 ml, κάθε πτερυγίδιο αντιστοιχεί σε 2 ml πάστας. Η απαιτούμενη δόση ρυθμίζεται με περιστροφή του δακτυλίου του εμβόλου. Εισάγετε τη σύριγγα στη γωνία του στόματος του ζώου έτσι ώστε το άκρο της σύριγγας να ακουμπά στο πίσω μέρος της γλώσσας. Η δόση απελευθερώνεται όταν μετά από απαλή πίεση του εμβόλου, ακουμπήσει ο δακτύλιος στο σώμα της σύριγγας. Η ημερήσια δόση του προϊόντος για το ζώο μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τον πίνακα παρακάτω. Συνιστάται η χορήγηση του προϊόντος για 7 -14 ημέρες.

Συσκευασία	Βάρος ζώου	Ποσότητα μιας διαβάθμισης	Δόση (Αριθμός διαβαθμίσεων)	
			Πρωί	Βράδυ

DIARSANYL® PLUS 10 ml	2 – 7 kg	1 ml	1	1
DIARSANYL® PLUS 24 ml	8 – 18 kg	2 ml	1	1
	19 – 30 kg		2	2
	31 – 40 kg		3	3
	41 – 50 kg		4	4
	> 50 kg		5	5

Φύλαξη:

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. Μακριά από παιδιά.

Παραγωγός: α FR 36 035 007

Τοπικός Αντιπρόσωπος: Ceva Ελλάς Επε, Εθνάρχου Μακαρίου 34, 16341 Ηλιούπολη, τηλ.: 210 9851200

Συσκευασία:

Κουτί χάρτινο με 1 σύριγγα 10 ml.

Κουτί χάρτινο με 1 σύριγγα 24 ml.