

WeHemo®

Συμπλήρωμα διατροφής για την καταπολέμηση της Αναιμίας



wepharm®
Animal Welfare

wepharm.pt



WeHemo® Πόσιμο εναιώρημα για Σκύλους και Γάτες



Το WeHemo® είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής για σκύλους και γάτες. Πλούσιο σε βιταμίνες και ανόργανα μέταλλα. Σημαντικό για τον μεταβολισμό και τον σχηματισμό των κυττάρων του αίματος. Συνιστάται επίσης για την υποστήριξη της ανάπτυξης των ζώων συντροφιάς.

Συσκευασία:

WeHemo® μπουκάλι 30 ml και
δοσομετρική σύριγγα



Βιβλιογραφία:

(1) Willard-Tvedten Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods 4^a ed. Saunders 39 (2) Clovis, Denise (2005) J. Bras. Patologia Médica v41 n5 323-34
(3) Curtis, Wheatley (2014) Nutritional composition of Jamaican citrus agro by-product with potential for nutraceutical product development - Research 2014;1:771 (4) Turk, Simoni (2012) Chronic Anemia and Effects of Iron Supplementation in a Research Colony of Adult Rhesus Macaques (Macaca mulatta) Comparative Medicine Vol 62, No 2 (5) Killip, Chambers (2007) Iron deficiency anemia. Am Fam Physician 75:671-678. (6) Giger U. Regenerative anemias caused by blood loss or hemolysis. In: Ettinger SJ, Feldman EC, eds. Textbook of Veterinary Internal Medicine. 6th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders, 2005:1886-1908.
(7) Naigamwalla, Webb, Giger (2012) Iron deficiency anemia Can Vet J 2012;53:250-256 (8) Moreira, Dias (2011) Propolis influence on erythrocyte membrane disorder (hereditary spherocytosis): A first approach Food and Chemical Toxicology 2011, issue 2, 520-526 (9) Aro, Lopez-Ariaga (2012) Beneficial Effect of Pollen and/or Propolis on the Metabolism of Iron, Calcium, Phosphorus, and Magnesium in Rats with Nutritional Ferropenic Anemia J. Agric. Food Chem. 2000, 48 (11), pp 5715-5722

Σύνθεση WeHemo®

Σίδηρος Δισγλυκινικός	6 mg
Βιταμίνη B1	3 mg
Βιταμίνη B2	3 mg
Νιασίνη	5 mg
Παντοθενικό Οξύ	5 mg
Βιταμίνη B6	2,5 mg
Φολικό οξύ	12 mg
Βιταμίνη B12	0,035 mg
Βιταμίνη C	5 mg
Βιταμίνη K3	0,5 mg
Χαλκός	0,552 mg
Ψευδάργυρος	5,5 mg
Κάλιο	78 mg
L-λυσίνη	0,5 mg
DL-Μεθειονίνη	0,5 mg
L-Φαινυλαλανίνη	0,5 mg
L-Ταυρίνη	0,5 mg
L-Θρεονίνη	0,5 mg
L-Αργινίνη	0,5 mg
L-Λευκίνη	0,5 mg
Ισολευκίνη	0,5 mg
L-Βαλίνη	0,5 mg
L-Ιστιδίνη	0,5 mg
Citrus paradisi - (Ελάχιστο 10% πολυφαινόλες)	0,001 mg
Πρόπολη (Ελάχιστο 10% πολυφαινόλες)	0,001 mg

Ανά ml πόσιμου εναιωρήματος

Συνιστώμενη δόση:

Σκύλοι και γάτες: 0,1 ml ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως (ισοδύναμο με δύο σταγόνες). Σε μεγαλόσωμα ζώα προτείνεται να χρησιμοποιήσετε την δοσομετρική σύριγγα στην ίδια δόση 0,1 ml ανά kg. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση

Το WeHemo® είναι ένα πόσιμο διάλυμα το οποίο μπορεί να χορηγηθεί απευθείας στο στόμα ή να προστεθεί στην τροφή των ζώων. Η περίοδος χορήγησης πρέπει να καθορίζεται από τον κτηνίατρο.

Συνιστάται η συμβουλή του κτηνιάτρου πριν από τη χρήση. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο πλήρους τροφής.

Wepharm, S.A.

Rua Principal, Lote 12/16C
Zona Industrial de Porto de Mós
2480-407 Porto de Mós
PORTUGAL

tel +351 244 768 700
fax +351 244 768 705
info@wepharm.pt



Know us better!

wepharm.pt

facebook.com/wepharm

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ: Ι. ΜΑΔΕΜΟΧΟΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ
ΑΘΗΝΑ: 210 6011640 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 23920 72020
www.jmco.gr | info@jmco.gr

WeHemo®

Συμπλήρωμα διατροφής για την καταπολέμηση της Αναιμίας

Ένα συμπλήρωμα πλούσιο σε σίδηρο, φολικό οξύ, βιταμίνες, μεταλλικά άλατα και αμινοξέα, απαραίτητο για την καταπολέμηση της αναιμίας & την αποτροπή εμφάνισής της.

Η Αναιμία είναι μία συνήθης παθολογική κατάσταση που προκύπτει από τον μειωμένο αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων ή την περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης και ως εκ τούτου μειώνεται η μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς.

Τα δύο τρίτα του απαιτούμενου σιδήρου για την παραγωγή της αιμοσφαιρίνης προέρχονται από την καταστροφή των ερυθροκυττάρων του αίματος, ενώ το ένα τρίτο προέρχεται από την διατροφή.

Υπάρχουν κι άλλα σημαντικά συστατικά για το σχηματισμό, την διατήρηση και την προστασία των ερυθρών κυττάρων.

Συνήθεις τύποι Αναιμίας

Αναγεννητική αναιμία

Αναιμία με απώλεια αίματος

- Εσωτερική απώλεια αίματος
- Εξωτερική απώλεια αίματος
- Σιδηροπενία

Αιμολυτική Αναιμία

- Ανοσο-διαμεσολαβούμενη
- Νόσος ψυχρών αιμοσυγκολητινών
- Παράσιτα του αίματος
- Αναιμία σωματίων Heinz και Μεθαιμοσφαιριναιμία
- Τοξικότητα Ψευδαργύρου ή Χαλκού
- Υποφωσφαταιμία
- Κληρονομική αιμολυτική αναιμία
- Ανεπάρκεια Πυροσταφυλικής Κινάσης (PK)
- Ανεπάρκεια Φωσφοφρουκτοκινάσης

Μη Αναγεννητική αναιμία

Δευτερεύουσες Αναιμίες

- Φλεγμονώδη Αναιμία
- Αναιμία χρόνιας νεφρικής νόσου
- Αναιμία χρόνιας ηπατικής νόσου
- Υποθυρεοειδισμός και υποφλοιοεπινεφριδισμός

Σιδηροπενική Αναιμία

Διαταραχές Μυελού των Οστών

- Απλαστική πανκυτταροπενία
- Μυелоϊνωση
- Αμιγής απλασία ερυθρών κυττάρων
- Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο
- Λευχαιμία
- Αιμοφαγοκυτταρικά σύνδρομα

Αιματολογική δυσκρασία διεγερόμενη από φάρμακα

- Τοξικότητα οιστρογόνων
- Τοξικότητα σουλφαδιαζίνης
- Τοξικότητα φαινυλοβουταζόνης

Μολύνσεις

- Ερlichiosis
- Λευχαιμία αιλουροειδών (FeLV)
- Ιός ανοσοανεπάρκειας αιλουροειδών (FIV)
- Πανλευκοπενία Αιλουροειδών

ΔΙΣΓΛΥΚΙΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ

Το WeHemo® περιέχει σίδηρο σε γλυκινική μορφή, μια μη ιοντική ένωση η οποία προσδίδει μία υψηλότερη βιοδιαθεσιμότητα (Δεκαπλάσια απορροφαισιμότητα σε σχέση με τον τρισθενή), χαμηλή τοξικότητα, υψηλή ανοχή, χωρίς αλληλεπίδραση με φάρμακα και συστατικά τροφίμων).

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Β

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β είναι απαραίτητες για τη διατροφή, αλλά μπορούν εύκολα να απουσιάζουν σε περιπτώσεις ανορεξίας και πολυουρίας. Ιδιαίτερα η έλλειψη της βιταμίνης Β12 σχετίζεται με την Αναιμία που προκύπτει από διαταραχές του μεταβολισμού του φολικού οξέως.

ΚΑΛΙΟ

Η υποκαλιαιμία παρατηρείται συχνά στα ζώα συντροφιάς, και είναι η πιο διαδεδομένη διαταραχή ηλεκτρολυτών σε περιπτώσεις χρόνιας νεφρικής νόσου. Έλλειψη σε Κάλιο μπορεί να εκδηλωθεί ως λήθαργος, ανορεξία και αδυναμία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ

Το WeHemo® περιέχει ένα μίγμα από βασικά αμινοξέα για την κυτταρική διαμόρφωση και τον μεταβολισμό. Επίσης περιέχει φολικό οξύ, βιταμίνη C και K, και ένα σύνολο άλλων συστατικών απαραίτητων για τον σχηματισμό, την ωρίμανση και το μεταβολισμό των κυττάρων του αίματος.

ΚΥΤΤΑΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Η Πρόπολη και τα βιοφλαβονοειδή συνδέονται με μια προστατευτική δράση του κυττάρου, μειώνοντας την οξειδωτική βλάβη και την ευθραυστότητα της μεμβράνης, ενώ συμβάλλει στον καλύτερο μεταβολισμό των ανόργανων μετάλλων, ειδικά του σιδήρου.

από :
(2004) Willard-Tvedten Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods 4th Edition Saunders, 39