

TABERDOG ΚΟΛΛΑΡΟ ΣΚΥΛΟΥ

Αντιπαρασιτικό κολλάρο

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ

Σύνθεση ανά κολλάρο: Περμεθρίνη 1,5 γρ. Έκδοχα: 15 γρ.

Είδος ζώου: Σκύλος

Ιδιότητες: Η περμεθρίνη είναι ένα δεύτερης γενιάς συνθετικό πυρεθροειδές που προκαλεί σπασμούς, παράλυση και θάνατο των κροτώνων.

Ενδείξεις: Α) Εξωτερική παρασίτωση από ψύλλους: *Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis* και *Pulex irritans*. Β) Εξωτερική παρασίτωση από κρότωνα: *Dermacentor* spp. , *Otobius megnini*, *Rhipicephalus* spp. Γ) Εξωτερική παρασίτωση από ψείρες: *Linognathus* spp. Δ) Απωθητικό κουνουπιών και σκνιπών.

Οδηγίες: Τοποθετήστε το κολλάρο γύρω από το λαιμό έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος να τοποθετηθούν δύο δάχτυλα κάτω από το κολλάρο και κόψτε το υπόλοιπο κομμάτι που περισσεύει. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν κολλάρο περπατήματος. Η συσκευασία πρέπει να ανοίγεται μόνο όταν το κολλάρο θα χρησιμοποιηθεί. Για να εξασφαλιστεί η διαρκής αντιπαρασιτική προστασία, θα πρέπει το κολλάρο να φοριέται μόνιμως και να αλλάζει κάθε 4 μήνες.

Αντενδείξεις – Παρενέργειες: Δεν έχουν αναφερθεί.

Προφυλάξεις: Αποφύγετε τη συνεχή επαφή με το δέρμα. Μετά την εφαρμογή, πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. Κατά την εφαρμογή, να μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Καταστρέψτε τη συσκευασία με ασφαλή τρόπο και να μην μολύνετε το περιβάλλον. Να μην καεί διότι παράγει τοξικά αέρια. Είναι τοξικό για ψάρια και μέλισσες.

Αποθήκευση: Διατηρήστε το σε δροσερό, ξηρό και σκιερό μέρος.